

Comment remplacer un oiseau ?

Vous avez trouvé un ou plusieurs oisillons et vous ne savez pas comment agir ? Ce petit guide est fait pour vous. Il vous permettra d'offrir la meilleure chance de survie à vos protégés.

Dans ce guide, vous trouverez des informations concernant le remplacement des :

- ◆ **Passereaux** (Mésange, Rougequeue, Moineau, etc.)
- ◆ **Corvidés** (Choucas, Pies, Coucous, etc.)
- ◆ **Rapaces nocturnes** (Chouettes, Hiboux)
- ◆ **Colombidés** (Tourterelles, Pigeons)
- ◆ **Rapaces diurnes** (Buses, Milans, Faucons, etc.)

Ce qu'il faut savoir :


- Les oiseaux sautent du nid avant de savoir voler, souvent sous l'impulsion des parents qui les encouragent dans ce sens. Pendant 4 ou 5 jours, ils sont en période d'apprentissage et leurs parents continuent à s'en occuper. Vous ne les voyez pas ? C'est normal, ils se font discrets à l'approche d'un intrus !!!
- Les oiseaux peuvent être remplacés **au maximum 2 jours après** leur découverte.
- Même s'ils ont été touchés, les parents les reprendront en charge. En revanche, il ne faut pas rester à côté, pour ne pas les effaroucher !
- Il ne faut **jamais** caresser, exhiber ou parler à un oiseau, il ne comprend pas et le stress peut provoquer chez certains spécimens un arrêt cardiaque.

Est-il en bonne santé ?

Pour vous assurer que l'oiseau est en phase d'émancipation et non pas abandonné (parents morts ou dans l'incapacité de le nourrir), vous pouvez palper l'animal et nous faire un retour sur son état général. Vous saurez ainsi s'il est en bonne condition physique.

1° : Observez l'animal : a-t-il le plumage ébouriffé ? Est-il apathique ? Cherche-t-il à se débattre ?

2° : L'embonpoint. Pour savoir si un animal est en bonne condition physique, il faut regarder au niveau du bréchet (**les blancs de poulets**) : si le bréchet est saillant (c'est-à-dire que l'os vertical du ventre se sent bien comme dans le schéma de droite ci-dessous) alors il faut le ramasser et l'apporter au centre de sauvegarde. **Sinon il faut le faire replacer !!**



A SAVOIR

◆ Des fausses idées à oublier

Nous prêtons plus facilement l'instinct parental aux mammifères, pourtant, les oiseaux sont également d'excellents parents ! Ils n'abandonnent jamais leur progéniture, même au péril de leur vie. Un humain ou un animal peut avoir mis son odeur sur leurs petits, ils continueront malgré tout de s'en occuper. Gardez cela à l'esprit lorsque vous replacerez l'animal ! Vous ne le mettez pas en danger, au contraire ! Vous lui offrez une merveilleuse opportunité : celle d'avoir une éducation complète et l'attention de ses parents.

Enfin, les oiseaux ne choisissent pas le lieu de ponte au petit bonheur la chance. La nature, au contraire, est très bien faite. Si les parents ont choisi cet endroit, c'est qu'il convient parfaitement à l'élevage de leurs petits.

◆ Quand je trouve un oiseau, je ne dois pas...



◆ Parler, exhiber ou faire des câlins à l'oiseau pour le rassurer

Cela ne fera effectivement que le stresser davantage. Certaines espèces sont très sensibles au stress et peuvent mourir d'arrêt cardiaque dans vos mains.

En attendant de savoir si vous pouvez le rendre à ses parents, mettez-le dans un carton du type boîte à chaussures, et placez-le dans une pièce calme, où il n'y a pas trop de passage.

◆ Nourrir l'oiseau

Même s'il réclame à manger, ne cédez pas. D'une part, pour ne pas risquer de lui donner des aliments inappropriés à son régime alimentaire ; d'autre part, pour lui permettre d'être repéré par ses parents. Un oisillon qui a faim appelle ses parents !

◆ Replacer un oiseau en émancipation dans son nid.

Il est inutile de replacer un oiseau qui commence à avoir de vraies plumes dans son nid : il a sauté de son plein gré avec les encouragements de ses parents. L'heure de l'apprentissage a sonné !! Tout comme les enfants, il doit grandir, apprendre à devenir autonome, mais toujours sous l'œil bienveillant de ses parents. Ces derniers sont cachés sous le couvert des arbres, mais sont bien présents et le surveillent avec vigilance. Si vous le replacez dans le nid, il sautera de nouveau aussitôt que vous aurez disparu ! Il a tant de choses à découvrir ! D'abord, il va devoir apprendre à voler et à se servir des outils que lui a donné la nature pour trouver sa nourriture. Puis il va devoir apprendre à reconnaître ses prédateurs naturels et à s'en protéger. Tout cela débute au sol et se poursuit dans les arbres, sur des branches accessibles pour leur vol maladroit. **Ainsi, la meilleure façon de lui venir en aide est de le laisser tranquille. A la rigueur, vous pouvez le placer en hauteur, sur la branche d'un arbre à proximité ou au pied duquel vous l'avez découvert.**

◆ Rester à proximité de l'oiseau une fois replacé, sinon je vais effrayer les parents.

Les passereaux

Rentre dans cette catégorie :

L'ensemble des passereaux insectivores et granivores de toutes tailles et de toutes espèces (rougequeue, mésanges, bergeronnettes, merles, grives, chardonnerets, serins cini, verdiers, moineaux, hirondelles...)



REMARQUE : Le martinet ne pouvant nourrir son petit au sol, il est nécessaire de ramener les poussins dans un centre de sauvegarde.

Avant tout : Il est impératif de connaître le stade de l'animal afin de savoir s'il peut être replacé et comment il peut être replacé.

Déterminer l'âge de l'oisillon

1. Le mini-poulet

Il a entre 1 et 7 jours : **replacement dans le nid** quand cela est possible !!! Sinon le ramener impérativement au centre de sauvegarde. Il a impérativement besoin d'aide.



S'il est tout nu façon « chewing-gum mâché »
ou « mini poulet rôti pas cuit »

L'oiseau a entre
1 et 7 jours environ

oeil fermé

à poil !

commisures jaunes

Besoin d'aide ?

- oui
- non
- peut-être

Il faut savoir qu'à cet âge-là, l'oiseau n'a qu'une chance infime de survivre, même lorsque des professionnels s'en occupent...



Poche de « lait » remplie :
oisillon nourri

2. Le Punk



Il a entre 12 et 14 jours : **replacement dans le nid** quand cela est possible !!! Sinon le ramener impérativement au centre de sauvegarde. Il a besoin d'aide !

S'il a quelques plumes qui commencent à sortir de leurs fourreaux et les yeux ouverts

L'oiseau a entre 12 et 14 jours environ

air de punk ébouriffé

petite queue trop choppie qui se forme

pattes qui font nimp

Besoin d'aide ?

- oui
- non
- peut-être

Les chances de survie de ce p'tit gars sont déjà plus grandes...



3. L'ado en émancipation

S'il est complètement plumé, mais paraît pataud, semble voler maladroitement, avec les coins du bec encore bien jaunes voire orange

L'oiseau a entre 15 et 25 jours environ

air « grumpy » de petit vieux


quoi, ma gueule ?

Besoin d'aide ?

- oui
- non
- peut-être

Ce gaillard-là vient peut-être de tenter son premier envol ! A moins d'être visiblement blessé, cet oiseau n'a souvent pas besoin d'aide et les parents ne sont pas loin.

Il a entre 15 et 25 jours : il ressemble à un adulte mais en miniature avec des plumes courtes, une toute petite queue, et encore un peu de duvet sur le haut de la tête. Il volette mais ses vols ne dépassent pas les quelques mètres et ont une tendance à aller vers le bas. Ce stade ne dure que quelques jours, d'ici peu il volera comme un grand et plus personne ne l'arrêtera.



Cas particuliers

Présence d'un danger immédiat (prédateur, route,...) : quand cela est possible, enfermer les prédateurs. S'il s'agit des chats des voisins et que vous ne pouvez contrôler leurs allées et venues, utilisez une petite cage ou construisez-la vous même. Placez l'oisillon à l'intérieur et accrochez-la en hauteur, non loin du lieu de découverte. Ses parents viendront le nourrir à travers les barreaux. **Attendez 3 jours puis ouvrez la porte de la cage, il sortira de lui même** et saura parfaitement voler. Il n'aura alors plus rien à craindre des prédateurs !!


Replacer un passereau ?

Oui mais pas n'importe comment !

Création et aménagement d'une cage provisoire

Vous avez besoin de...

- ◆ Une cagette en bois (faire attention aux ouvertures, les combler avant de placer l'oiseau avec des lattes de bois par exemple, du grillage, etc.) ;

 **Evitez le carton** si possible ! S'il pleut, le carton se gorgera d'eau et se déformera. L'oiseau ne sera plus au sec ni en sécurité ;

- ◆ D'une matière naturelle (terre, aiguilles de pin, feuilles, etc.) afin d'en tapisser le fond ;
- ◆ D'un couvercle de bocal afin de mettre à la disposition de l'oiseau de l'eau en toute sécurité : il ne se noiera pas dans un couvercle ;
- ◆ Un gros caillou faisant office de perchoir ;
- ◆ Une branche calée entre deux barreaux pour lui permettre de se percher ;
- ◆ Une grosse corbeille de fruits en métal ou en plastique dur que vous renverserez sur la cagette afin de fermer la cage. Ou du grillage que vous pouvez découper. Lier ensuite chaque paroi avec de la ficelle ou des agrafes en plastique, etc. (Photo ci-dessous).



IMPORTANT

Ne remplacez pas l'oiseau juste **avant la tombée de la nuit**, les parents n'auraient pas le temps de le repérer. Si vous l'avez trouvé en fin de journée, gardez-le au chaud chez vous pour la nuit dans un carton et remettez-le dehors au petit matin.

L'oisillon doit être replacé non loin de son lieu de découverte afin d'être retrouvé par ses parents. Vous pouvez le replacer **dans un périmètre de 50 mètres maximum** autour du site de découverte, pas au-delà !

Une fois replacé, ne restez pas à proximité de l'oiseau !!


Les rapaces nocturnes

Cela concerne toutes les espèces de rapaces nocturnes **avec une exception : l'Effraie des clochers !!!** Une **jeune Effraie des clochers en duvet ou en émancipation au sol** est une Effraie des clochers **morte**. Il y a seulement deux solutions pour cette espèce :

- ♦ La replacer directement dans le nid. Pas à côté ni en dessous ni au-dessus mais bien dans le nid.
- ♦ Si le nid est introuvable, la ramener le plus rapidement possible au centre de sauvegarde pour qu'elle soit prise en charge.



Chouette effraie juvénile : visage en cœur blanc, bec en longueur, peu proéminent, duvet blanc-gris, yeux noirs



Chouette effraie adulte : visage en cœur, bec en longueur, grands yeux noirs

Pour toutes les autres espèces de rapaces nocturnes :

Il est impératif de connaître le stade de l'oiseau afin de savoir s'il peut être réplacé et comment il peut être réplacé.

Période de sortie de nids

- Chouette hulotte** : de février à juillet
- Chevêche d'Athéna** : début juin à fin juillet
- Effraie des clochers** : de mars à juin
- Petit-Duc scops** : de fin juin à fin août
- Hibou moyen-duc** : de mars à mai
- Grand-duc d'Europe** : début juin à fin juillet

Astuces pour les reconnaître :

- Chouette hulotte** : yeux noirs
- Chevêche d'Athéna** : yeux jaunes
- Effraie des clochers** : visage en forme de cœur et yeux noirs
- Petit-Duc scops** : yeux ronds jaunes/verts, plumage ressemblant à de l'écorce
- Hibou moyen-duc** : yeux oranges ou jaunes

1. Le mini Yéti



Il a entre 1 et 7 jours : **replacement dans le nid** quand cela est possible !!! Sinon le ramener impérativement au centre de sauvegarde

Les poussins sont couverts d'un duvet blanc-gris



2. L'ado Punk en émancipation

Il est en émancipation, il a plus de 36 jours : il a encore du duvet et ses plumes sont dans ses canons mais il est encore incapable de voler sur plusieurs mètres.



Amorce de véritables plumes
Canons des plumes bien visibles

L'ado Punk ne doit pas être replacé dans le nid !!! Comme expliqué auparavant, ce poussin est en émancipation et a sauté de lui-même !

Si vous le trouvez dans la journée, la seule aide que vous pouvez lui apporter est de le mettre dans un carton, de le rentrer chez vous au chaud et de le placer dans une pièce calme afin qu'il continue sa nuit. Le soir venu, il suffit de le déposer sur une branche en hauteur non loin du lieu où vous l'avez trouvé. Cela sera votre meilleur geste de bienveillance envers lui !

Cas particuliers

- ◆ **Présence d'un danger imminent (prédateurs)** : quand cela est possible, enfermez les prédateurs. S'il s'agit des chats des voisins et que vous ne pouvez contrôler leurs allées et venues, utilisez une cagette renforcée ou un carton. Placez l'oiseau à l'intérieur et **accrochez le carton en hauteur juste en-dessous d'une branche, non loin de l'endroit où vous l'avez trouvé**. Ses parents le nourriront en déposant des proies directement dans le carton. D'ici 3 à 5 jours, il sera suffisamment fort pour sortir seul de son carton et saura parfaitement voler, ne craignant alors plus rien des prédateurs.
- ◆ **Présence d'une route** : l'oiseau peut être placé dans un **périmètre de 200 à 300 m autour du site de découverte**, alors ouvrez grand vos yeux : il doit forcément avoir un endroit tranquille pour lui loin de la circulation. N'oubliez pas : les rapaces nocturnes sont des oiseaux qui adorent utiliser les trous dans les platanes pour y nicher. Il n'est donc pas étonnant de rencontrer une jeune Chouette hulotte ou encore un jeune hibou moyen-Duc près d'une nationale.
- ◆ **Abattage d'un arbre** : si le jeune est en phase 1 "le mini yéti", il doit être impérativement ramené au centre de sauvegarde. Si le jeune est en phase 2 "l'ado punk en émancipation", il doit être replacé comme indiqué ci-dessous dans l'arbre le plus proche de celui venant d'être abattu ou, dans le cas où il n'y aurait pas d'arbre aux alentours, sur une haie, un bord de fenêtre ou un mur en hauteur.

Choix du carton ou de la cagette :

Ex 1 : Hulotte, Moyen-Duc, etc.

- hauteur / profondeur maximale : 30 cm
- longueur minimale : 60 cm
- largeur minimale : 60 cm

Ex 2 : Petit-Duc, Chevêche, etc.

- hauteur maximale : 20 cm
- longueur minimale : 35 cm
- largeur minimale : 35 cm

Aménagement du carton :

- dans le fond placez du journal
- un caillou faisant office de perchoir



IMPORTANT

- . Ne nourrissez jamais l'oiseau ! S'il est rassasié, il n'appellera pas ses parents et ne pourra donc pas être repéré par ceux-ci.
- . Ne remplacez pas l'oiseau dans la journée. Cela évitera qu'il devienne la proie des prédateurs au moment où il est le plus vulnérable, c'est-à-dire quand il dort !! Placez-le dans un carton fermé et installez-le dans une pièce calme et tempérée jusqu'au soir.
- . Pour relâcher l'oiseau, attendez la fin de la journée. Les 30 dernières minutes avant la tombée de la nuit sont idéales ! Vous devez le remplacer non loin de son lieu de découverte afin qu'il soit retrouvé par ses parents. Le **périmètre maximum pour remplacer un rapace nocturne est de 200 à 300 m** autour du site de découverte.
- . Une fois remplacé, ne restez pas à proximité de l'oiseau afin de ne pas effrayer les parents !! Rappelez-vous : les humains sont les prédateurs n°1 de la faune sauvage !

Les rapaces diurnes

Il est impératif de connaître le stade de l'animal afin de savoir s'il peut être replacé et comment il peut être replacé.

1. Le mini Yéti



Il a entre 1 et 7 jours : **replacement dans le nid** quand cela est possible !!! Sinon le ramener impérativement au centre de sauvegarde. Il a impérativement besoin d'aide.



Les poussins sont couverts d'un duvet blanc



2. L'ado Punk en émancipation

Il est en émancipation. Il a plus de 36 jours : il a encore du duvet et ses plumes sont dans ses canons, mais il est encore incapable de voler sur plusieurs mètres.

Le duvet blanc laisse place à un plumage moucheté et les plumes des ailes se distinguent même si elles sont plus courtes que celles des adultes.

L'ado Punk ne doit pas être replacé dans le nid ! Comme expliqué auparavant, ce poussin est en émancipation et a sauté de sa propre volonté et sous les encouragements de ses parents !

Si vous le trouvez dans la journée, il suffit de le déposer sur une branche en hauteur non loin du lieu où vous l'avez trouvé. Cela sera votre meilleur geste de bienveillance envers lui !!

Cas particuliers

- ◆ **Présence d'un danger imminent (prédateurs)** : quand cela est possible, enfermez les prédateurs. S'il s'agit des chats des voisins et que vous ne pouvez contrôler leurs allées et venues, utilisez une cagette rehaussée ou un carton. Placez l'oiseau à l'intérieur et **accrochez le carton en hauteur juste en dessous d'une branche, non loin de l'endroit où vous l'avez trouvé**. Ses parents le nourriront en déposant des proies directement dans le carton. D'ici 3 à 5 jours, il sera suffisamment fort pour sortir seul de son carton et saura parfaitement voler, ne craignant alors plus rien des prédateurs.
- ◆ **Présence d'une route** : l'oiseau peut être placé dans un **périmètre de 200 à 300 m autour du site de découverte**, alors ouvrez grand vos yeux : il doit forcément avoir un endroit tranquille pour lui loin de la circulation.
- ◆ **Abattage d'un arbre** : si le jeune est en phase 1 "le mini yéti", il doit être impérativement ramené au centre de sauvegarde. Si le jeune est en phase 2 "l'ado punk en émancipation", il doit être replacé comme indiqué ci-dessous dans l'arbre le plus proche de celui venant d'être abattu ou, dans le cas où il n'y aurait pas d'arbre aux alentours, sur une haie, un bord de fenêtre ou un mur en hauteur.

Choix du carton ou de la cagette :

Ex 1 : Faucon, Epervier, etc.

- hauteur / profondeur maximale : 30 cm
- longueur minimale : 60 cm
- largeur minimale : 60 cm

Ex 2 : Buse, Milan, Bondrée, etc.

- hauteur maximale : 40 cm
- longueur minimale : 80 cm
- largeur minimale : 80 cm

Aménagement du carton :

- dans le fond placez du journal
- un caillou faisant office de perchoir



IMPORTANT

- . Ne nourrissez jamais l'oiseau ! S'il est rassasié, il n'appellera pas ses parents et ne pourra donc pas être repéré par ceux-ci.
- . Ne remplacez pas l'oiseau dans la journée. Cela évitera qu'il devienne la proie des prédateurs au moment où il est le plus vulnérable, c'est-à-dire quand il dort !! Placez-le dans un carton fermé et installez-le dans une pièce calme et tempérée jusqu'au soir.
- . Pour relâcher l'oiseau, attendez la fin de la journée. Les 30 dernières minutes avant la tombée de la nuit sont idéales ! Vous devez le replacer non loin de son lieu de découverte afin qu'il soit retrouvé par ses parents. Le **périmètre maximum pour replacer un rapace nocturne est de 200 à 300 m** autour du site de découverte.
- . Une fois replacé, ne restez pas à proximité de l'oiseau afin de ne pas effrayer les parents !! Rappelez-vous : les humains sont les prédateurs n°1 de la faune sauvage !

Les corvidés

Rentre dans cette catégorie l'ensemble des corvidés de toutes tailles et de toutes espèces : pie bavarde, choucas des tours, corbeau freux, grand corbeau, corneille noire, geai des chênes...

Mais cela fonctionne aussi pour les huppés fasciés, les rolliers d'Europe, les guêpiers d'Europe et autres oiseaux migrants !

Il est impératif de connaître le stade de l'animal afin de savoir s'il peut être réplacé et comment il peut être réplacé.

1. Le mini Yéti



Il a entre 1 et 7 jours : **replacé dans le nid** quand cela est possible !!! Sinon le ramener impérativement au centre de sauvegarde. Il a impérativement besoin d'aide.



L'oiseau a du mal à tenir sur ses pattes qui semblent disproportionnées par rapport au reste de son corps. Quelques plumes sortent de leurs fourreaux mais il y a encore des zones où la peau apparaît nue.

2. L'ado grincheux en émancipation

Il est en émancipation. Il a plus de 36 jours : il a encore du duvet et ses plumes sont dans ses canons, mais il est encore incapable de voler sur plusieurs mètres.

Les pattes semblent disproportionnées par rapport au reste de son corps, les plumes des ailes se distinguent même si elles sont plus courtes que celles des adultes. L'oiseau a le regard grincheux



L'ado grincheux ne doit pas être réplacé dans le nid !!! Comme expliqué auparavant, ce poussin est en émancipation et a sauté de sa propre volonté et sous les encouragements de ses parents !

Si vous le trouvez dans la journée, il suffit de le déposer sur une branche en hauteur non loin du lieu où vous l'avez trouvé. Même en ville il y a des espaces protégés. Pensez aux balcons, rebords de fenêtre, haies, murs...

Cas particuliers

- ◆ **Présence d'un danger imminent (prédateurs) :** quand cela est possible, enfermez les prédateurs. S'il s'agit des chats des voisins et que vous ne pouvez contrôler leurs allées et venues, utilisez une cagette rehaussée ou un carton. Placez l'oiseau à l'intérieur et **accrochez-le carton en hauteur juste en dessous d'une branche, non loin de l'endroit où vous l'avez trouvé**. Ses parents le nourriront en déposant des proies directement dans le carton. D'ici 3 à 5 jours, il sera suffisamment fort pour sortir seul de son carton et saura parfaitement voler, ne craignant alors plus rien des prédateurs.
- ◆ **Présence d'une route :** l'oiseau peut être placé dans un **périmètre de 200 à 300 m autour du site de découverte**, alors ouvrez grand vos yeux : il doit forcément avoir un endroit tranquille pour lui loin de la circulation.
- ◆ **Abattage d'un arbre :** si le jeune est en phase 1 "le mini yéti", il doit être impérativement ramené au centre de sauvegarde. Si le jeune est en phase 2 "l'ado punk en émancipation", il doit être replacé comme indiqué ci-dessous dans l'arbre le plus proche de celui venant d'être abattu ou, dans le cas où il n'y aurait pas d'arbre aux alentours, sur une haie, un bord de fenêtre ou un mur en hauteur.

Choix du carton ou de la cagette :

- hauteur / profondeur maximale : 25 cm
- longueur minimale : 40 cm
- largeur minimale : 40 cm

Aménagement du carton :

- dans le fond placez du journal
- un caillou faisant office de perchoir



IMPORTANT

- . Ne nourrissez jamais l'oiseau ! S'il est rassasié, il n'appellera pas ses parents et ne pourra donc pas être repérés par ceux-ci.
- . Ne replacez pas l'oiseau dans la journée. Cela évitera qu'il devienne la proie des prédateurs au moment où il est le plus vulnérable, c'est en dire quand il dort !! Placez-le dans un carton fermé et installez-le dans une pièce calme et tempérée jusqu'au soir.
- . Pour relâcher l'oiseau, attendez la fin de la journée. Les 30 dernières minutes avant la tombée de la nuit sont idéales ! Vous devez le replacer non loin de son lieu de découverte afin qu'il soit retrouvé par ses parents. Le **périmètre maximum pour replacer un rapace nocturne est de 200 à 300** autour du site de découverte.
- . Une fois replacé, ne restez pas à proximité de l'oiseau afin de ne pas effrayer les parents !! Rappelez-vous : les humains sont les prédateurs n°1 de la faune sauvage !

Les colombidés

Rentre dans cette catégorie l'ensemble des colombidés : Pigeons ramiers, Pigeons bisets, Tourterelles turques, Tourterelles des bois...



Les Pigeons bisets (ou Pigeons des villes) ont un statut particulier et ne peuvent être accueillis au centre de sauvegarde. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Il est impératif de connaître le stade de l'animal afin de savoir s'il peut être replacé et comment il peut être replacé.

1. Le mini Yéti



Il a entre 1 et 7 jours : **replacé dans le nid** quand cela est possible !!! Sinon le ramener impérativement au centre de sauvegarde. Il a impérativement besoin d'aide.



Couvert d'un duvet jaune ressemblant à des poils, bec disproportionné et mou



2. L'ado punk en émancipation

Il est en émancipation. Il a plus de 36 jours : il a encore du duvet mais cette fois-ci de couleur grise. Ses plumes sont dans ses canons mais il est encore incapable de voler sur plusieurs mètres.

Le duvet jaune laisse place à un plumage moucheté et les plumes des ailes se distinguent même si elles sont plus courtes que celles des adultes

L'ado punk ne doit pas être replacé dans le nid !!! Comme expliqué auparavant, ce poussin est en émancipation et a sauté de sa propre volonté et sous les encouragements de ses parents !

Si vous le trouvez dans la journée, il suffit de le déposer sur une branche en hauteur non loin du lieu où vous l'avez trouvé. Même en ville, il y a des espaces protégés. Pensez aux balcons, rebords de fenêtre, haies, murs...

Cas particuliers

- ◆ **Présence d'un danger imminent (prédateurs) :** quand cela est possible, enfermez les prédateurs. S'il s'agit des chats des voisins et que vous ne pouvez contrôler leurs allées et venues, utilisez une cagette rehaussée ou un carton. Placez l'oiseau à l'intérieur et **accrochez le carton en hauteur juste en dessous d'une branche, non loin de l'endroit où vous l'avez trouvé**. Ses parents le nourriront en déposant des proies directement dans le carton. D'ici 3 à 5 jours, il sera suffisamment fort pour sortir seul de son carton et saura parfaitement voler, ne craignant alors plus rien des prédateurs.
- ◆ **Présence d'une route :** l'oiseau peut être placé dans un **périmètre de 200 à 300 m autour du site de découverte**, alors ouvrez grand vos yeux : il doit forcément avoir un endroit tranquille pour lui loin de la circulation.
- ◆ **Abattage d'un arbre :** si le jeune est en phase 1 "le mini yéti", il doit être impérativement ramené au centre de sauvegarde. Si le jeune est en phase 2 "l'ado punk en émancipation", il doit être replacé comme indiqué ci-dessous dans l'arbre le plus proche de celui venant d'être abattu ou, dans le cas où il n'y aurait pas d'arbre aux alentours, sur une haie, un bord de fenêtre ou un mur en hauteur.

Choix du carton ou de la cagette :

- hauteur / profondeur maximale : 25 cm
- longueur minimale : 40 cm
- largeur minimale : 40 cm

Aménagement du carton :

- dans le fond placez du journal
- un caillou faisant office de perchoir



IMPORTANT

- . Ne nourrissez jamais l'oiseau ! S'il est rassasié, il n'appellera pas ses parents et ne pourra donc pas être repérés par ceux-ci.
- . Ne remplacez pas l'oiseau dans la journée. Cela évitera qu'il devienne la proie des prédateurs au moment où il est le plus vulnérable, c'est en dire quand il dort !! Placez-le dans un carton fermé et installez-le dans une pièce calme et tempérée jusqu'au soir.
- . Pour relâcher l'oiseau, attendez la fin de la journée. Les 30 dernières minutes avant la tombée de la nuit sont idéales ! Vous devez le replacer non loin de son lieu de découverte afin qu'il soit retrouvé par ses parents. Le **périmètre maximum pour replacer un rapace nocturne est de 200 à 300 m** autour du site de découverte.
- . Une fois replacé, ne restez pas à proximité de l'oiseau afin de ne pas effrayer les parents ! Rappelez-vous : les humains sont les prédateurs n°1 de la faune sauvage !

Crédit photo

Images de BD - Oisillon en Détresse : que faire ? De Margaux Mara

Pour la lire : <http://www.margauxmara.com/blog/oisillon-en-dtresse-que-faire>

Certaines photos : C. Rambal

Attention

Les soins à la faune sauvage sont très différents des soins à la faune domestique.

Pour favoriser les chances de survie de l'animal, les conseils donnés par des professionnels doivent être suivis à la lettre.

Dans le cas d'un mauvais remplacement (trop tardif, gîte mal fixé, etc.), les petits ne pourront être récupérés par les parents et seront abandonnés.

Si vous décidez de les garder et de les élever, sachez que les conséquences d'une mauvaise prise en charge sont nombreuses : carences dues à une mauvaise alimentation, blessures suite à un mauvais conditionnement, application de mauvais traitements pour soigner une maladie, etc. Cela peut entraîner un handicap physique ou la mort de l'animal. Enfin, comme les humains, les animaux apprennent de leurs parents par mimétismes. Un animal élevé par un humain, sans représentant de son espèce, n'est donc pas sans conséquences et peut engendrer un handicap social qui l'empêchera de trouver une place au sein de ses congénères.

La Faune Sauvage et la Loi

La détention d'animaux sauvages est interdite sans autorisation spéciale.

N'hésitez pas à contacter le Centre de Sauvegarde ou l'ONCFS de votre département pour plus de renseignements.

Nous contacter

Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage

LPO Hérault

15 rue du Faucon crécerellette

Route de Loupian, Les Cigales

34560 Villeveyrac

Retrouvez-nous sur nos réseaux

sociaux pour partager vos expériences

<http://herault.lpo.fr/>

<https://www.facebook.com/CRSFS34/>



FAUNE EN DETRESSE - CENTRE DE LA LPO HERAULT